

# Information Chenilles processionnaires

Des regroupements de chenilles processionnaires ont été mis en évidence autour du village.



## Quelques explications ...

Quelques semaines après son éclosion, la chenille processionnaire se dote de soies urticantes qu'elle libère lorsqu'elle se sent en danger. Ces soies, en forme de harpon, peuvent se fixer sur l'épiderme, les yeux ou les voies respiratoires de quiconque s'approche de l'insecte. Il suffit alors de se gratter pour qu'elles se cassent et diffusent dans l'organisme une protéine toxique appelée thaumétopoéine.

Les animaux domestiques (chiens, chats) sont les premières victimes de cette contamination. Les jeunes chiots sont tout particulièrement exposés : curieux de tout, ils ne manqueront pas de coller la truffe ou la langue sur une belle procession de chenilles. Les conséquences peuvent être terribles. L'inflammation et l'œdème de la langue ou de la muqueuse buccale résultants peuvent les empêcher de se nourrir ou de s'abreuver. L'envenimation peut aller jusqu'à des nécroses sur toute la région buccale. Les ablations de la langue ne sont pas rares dans ce cas. Nombreux sont les vétérinaires ayant dû sacrifier des chiens ou des chats gravement blessés par la processionnaire.

Les animaux de ferme sont aussi touchés par cet insecte. En particulier les chevaux, les moutons, et les vaches. Leur faute : brouter l'herbe sur laquelle est passée la procession. Chez les ruminants, les premiers symptômes d'envenimation ressemblent à s'y méprendre à ceux causés par la fièvre aphteuse.



Les conséquences sur l'homme sont généralement moins graves. La plupart du temps, une exposition aux soies urticantes de la chenille se traduit par une simple démangeaison accompagnée de boutons qui disparaissent au bout de deux ou trois jours. Parfois, la réaction va jusqu'à l'œdème. Dans certains cas très rares, au maximum 2 à 3 % de la population, cette exposition peut conduire à un choc anaphylactique, une réaction allergique exacerbée nécessitant une hospitalisation. À noter que chez les personnes en contact régulier avec la processionnaire (travailleurs forestiers, chercheurs spécialistes de la chenille), la réaction peut aller crescendo au fur et à mesure des expositions. (Extrait document INRA)

Comment les repérer ? Quelques photos ....



Si vous mettez en évidence des nids dans votre terrain ou lors de vos promenades, merci de le signaler à la mairie en évitant tout contact direct avec ces insectes

Site internet : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire\\_du\\_pin](http://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_pin)

<http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Tous-les-dossiers/Processionnaire-du-pin-une-chenille-sous-haute-surveillance/>

<http://conseils-veto.com/chenilles-processionnaires-chien-traitement/>